

レジメン名称 : 呼内 PEM/CBDCA/ベバシズマブ (2回目アプレピ) タントインターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	6 (AUC)	1000mg	6	AUC
06	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	15mg/kg	1500mg	15	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/ベバシズマブ (2回目ア 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/ベバシズマブ (2回目ア 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/ベバシズマブ (2回目ア 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:40						
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/ベバシズマブ (2回目ア 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:10						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/ベバシズマブ (2回目ア 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:40						
06	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL	0mg 1B	12:55						

レジメン名称 : 呼内 PEM/CBDCA/へ`ハ`シス`マブ` (2回目ア`プレ`タ`ト`インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
07	点滴注射	療法名:呼内 PEM/CBDCA/へ`ハ`シス`マブ` (2回目ア`プレ`タ`ト` 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CBDCA/へ`ハ`シス`マブ` (2回目ア`プレ`タ`ト` 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	13:55						