

レジメン名称 : 呼内 PEM/CDDP/へバシズマブ・アプレタント(初回インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg)	500mg/m2	1000mg	500	mg/m2
06	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	75mg/m2	150mg	75	mg/m2
07	点滴注射	へバシズマブBS注(100mg 400mg)	15mg/kg	1500mg	15	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/へバシズマブ・アプレタ 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレタント125mg内服	8mL 1袋	09:00						
02	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 PEM/CDDP/へバシズマブ・アプレタ 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/へバシズマブ・アプレタ 点滴注射: 点滴速度 324ml/h : *点滴時間 20分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1V 1B	11:00						
04	点滴注射	ペメトレキセド点滴静注液 (100mg 500mg 800mg) 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/へバシズマブ・アプレタ 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 10分で 投与経路:末梢側管1 葉酸 (パレタ) 処方確認 メコバル筋注 (9週毎)	0mg 1B	11:20						
05	点滴注射	20% マンニトール注射液 300mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/へバシズマブ・アプレタ 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で	1B	11:30						

レジメン名称 : 呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタント(初回インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	点滴注射	投与経路:末梢側管1 シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタ 点滴注射: 点滴速度 2000ml/h : *点滴時間 1時間で	0mg 1袋	12:00						
07	点滴注射	投与経路:末梢側管1 アレルギーに注意 ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタ 点滴注射: 点滴速度 67ml/h : *点滴時間 1.5時間で	0mg 1B	13:00						
08	点滴注射	投与経路:末梢側管1 ソリター-T3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタ 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で	1袋	13:00						
09	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタ 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 1時間で	1袋	14:00						
10	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタ 点滴注射: *点滴速度 500ml/h : 点滴時間 6分で	1B	1回						
11	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ベバシズマブ前フラッシュ 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 PEM/CDDP/ベバシズマブ・アプレクタ 点滴注射: *点滴速度 300ml/h : 点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ベバシズマブ後フラッシュ	1B	1回						