

レジメン名称 : 呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|-----------------------------|----------|--------|-----|-------|
| 03 | 点滴注射 | [PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) | 200mg/m2 | 400mg | 200 | mg/m2 |
| 04 | 点滴注射 | カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) | 6 (AUC) | 1000mg | 6 | AUC |
| 06 | 点滴注射 | ベバシズマブBS注 (100mg 400mg) | 15mg/kg | 1500mg | 15 | mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 122ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アプレタント125mg内服 day2,3確認 | 1.5V 1A 1A 1V 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | [PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フィルター使用 血管外漏出に注意 | 0mg 1袋 | 11:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 337ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アレルギーに注意 | 0mg 1袋 | 14:00 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL | 1B | 15:30 | | | | | | |

レジメン名称 : 呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) アプレ インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL | 0mg 1B | 15:45 | | | | | | |
| 07 | 点滴注射 | 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 67ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 生理食塩液 50mL 療法名:呼内 TC (PTX/CBDCA) / ベバシズマブ (初回) 点滴注射: *点滴速度 300ml/h : 点滴時間 10分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 17:15 | | | | | | |