Page : 1/1

レジメン名称: 乳腺 EC

インターバル日数:21 日

印刷日時 20

2022-04-08 17:10:24 **基準日**: Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	エピルビシン注射用50mg	70 mg/m2	140mg	70	mg/m2
04	点滴注射	エント゛キサン注 (100mg 500mg)	500 mg/m2	$1000 \mathrm{mg/m2}$	500	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1			
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg	2V	10:00			
		グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL	1袋				
		療法名:乳腺 EC					
		点滴注射:					
		点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で					
		投与経路:末梢側管1					
		側管①と同時スタート					
02	点滴注射	ソリタ-T3号 輸液 200mL 「YD」	1袋	10:00			
		療法名:乳腺 EC					
		点滴注射:					
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 2時間で					
		投与経路:末梢ルートメイン1					
		メイン①と同時スタート(側管より)					
03	点滴注射	エピルビシン注射用50mg	0mg	10:30			
		生理食塩液 100mL	1B				
		療法名:乳腺 EC					
		点滴注射:					
		点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で					
		投与経路:末梢側管1					
		血管痛に配慮					
		血管外漏出に注意					
04	点滴注射	エント゛キサン注 (100mg 500mg)	0mg	10:45			
		ブドウ糖注 5% 100mL	1V				
		療法名:乳腺 EC					
		点滴注射:					
		点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で					
		投与経路:末梢側管1					