

レジメン名称 : 整形 DXR単剤 (NEC095J)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|-------------------------|---------|-----------|-----|-------|
| 03 | 点滴注射 | ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) | 30mg/m2 | 31.5mg/m2 | 30 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|------|---|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:整形 DXR単剤 (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 | 1V 1A 1袋 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | | | | |
| 02 | 点滴注射 | ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:整形 DXR単剤 (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | | | | |
| 03 | 点滴注射 | ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 100mL 療法名:整形 DXR単剤 (NEC095J) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 | 0mg 1B | 12:00 | 12:00 | 12:00 | | | | |