

レジメン名称 : 頭頸部 Cet/PTX(2回目以降)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|-----------------------------|----------|------------|-----|-------|
| 02 | 点滴注射 | アービタックス注射液 100mg | 250mg/m2 | 262.5mg/m2 | 250 | mg/m2 |
| 04 | 点滴注射 | [PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) | 80mg/m2 | 84mg/m2 | 80 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:頭頸部 Cet/PTX(2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1V 1A 1A 1袋 | 10:30 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸部 Cet/PTX(2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 5250ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 11:00 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 100mL 療法名:頭頸部 Cet/PTX(2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 12:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | [PTX] パクリタキセル注 (30mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:頭頸部 Cet/PTX(2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 650ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 13:00 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:頭頸部 Cet/PTX(2回目以降) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 14:00 | | | | | | |