

レジメン名称 : (リウマチ) インフリキシマブ<sup>®</sup> BS (3mg/kg) (3回目～)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg	3mg/kg	300mg	3	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ハイドロコートン注射液 100mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:(リウマチ) インフリキシマブ <sup>®</sup> BS (3mg/kg) (3回目～) 点滴注射: 点滴速度 208mL/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:(リウマチ) インフリキシマブ <sup>®</sup> BS (3mg/kg) (3回目～) 点滴注射: 点滴速度 125mL/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:15						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:(リウマチ) インフリキシマブ <sup>®</sup> BS (3mg/kg) (3回目～) 点滴注射: 点滴速度 600mL/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:15						