

レジメン名称：リ膠 強皮症リツキシマブ[®] (600mg) (初回)

インターバル日数：7 日

基準日： Day 1

使用する抗がん剤：

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------|-------|-------|-----|----|
| 02 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) | 100mg | 100mg | 100 | mg |
| 03 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) | 500mg | 500mg | 500 | mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名：リ膠 強皮症リツキシマブ [®] (600mg) (初回) 点滴注射： 点滴速度 102ml/h：*点滴時間 30分で 投与経路：末梢ルートメイン1 | 1A 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 100mL 療法名：リ膠 強皮症リツキシマブ [®] (600mg) (初回) 点滴注射： 点滴速度 22.5ml/h：*点滴時間 4時間で 投与経路：末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h | 0mg 90mL | 10:30 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名：リ膠 強皮症リツキシマブ [®] (600mg) (初回) 点滴注射： 点滴速度 90ml/h：*点滴時間 5時間で 投与経路：末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h | 0mg 450mL | 12:30 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名：リ膠 強皮症リツキシマブ [®] (600mg) (初回) 点滴注射： 点滴速度 600ml/h：*点滴時間 5分で 投与経路：末梢ルートメイン1 フラッシュ用 | 1B | 1回 | | | | | | |