

レジメン名称 : GEM/BV(10mg/kg) (d15)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2
04	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg)	10mg/kg	1000mg	10	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:GEM/BV(10mg/kg) (d15) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/BV(10mg/kg) (d15) 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:GEM/BV(10mg/kg) (d15) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
04	点滴注射	アバスチン注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:GEM/BV(10mg/kg) (d15) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 2回目60分まで短縮可能 3回目以降30分まで短縮可能	0mg 1B	11:15						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:GEM/BV(10mg/kg) (d15) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	12:15						