

レジメン名称 : NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
03	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 103ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 アプレビタト125mg内服 day2,3処方 内服30分後に開始	3A 1袋	10:00						
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 375ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 アレルギーに注意	0mg 1袋	12:30						
04	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	14:00						
05	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トボ)アプレビタト 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	2A 1袋							

レジメン名称 : NDP/CPT-11(ネダ・トポ)アプレピタト

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
06	点滴注射  <次ページあり>	生理食塩液 50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トポ)アプレピタト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルート1	1B							

レジメン名称 : NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 103ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アプレピタント125mg内服 day2.3処方 内服30分後に開始	3A 1袋							
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 375ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アレルギーに注意	0mg 1袋							
04	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
05	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2A 1袋	10:00						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレピタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:30						
	<次ページあり>									

レジメン名称 : NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント 点滴注射: 点滴速度 103ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 アプレビタント125mg内服 day2.3処方 内服30分後に開始	3A 1袋							
02	点滴注射	イリノテカン点滴静注液 (40mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント 点滴注射: 点滴速度 375ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	アクプラ静注用(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント 点滴注射: 点滴速度 333ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
04	点滴注射	アレルギーに注意 ソリューゲン F注 500mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
05	点滴注射	デキサート注射液 1.65mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	2A 1袋	10:00						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:NDP/CPT-11(ネダ・トホ)アプレビタント 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:30						