

レジメン名称 : PLD(ドキシル)/CBDCA

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ドキシル注 20mg	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	5 (AUC)	6 (AUC)	5	AUC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:PLD(ドキシル)/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 114ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ドキシル注 20mg ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:PLD(ドキシル)/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:PLD(ドキシル)/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:30						
04	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 250mL 療法名:PLD(ドキシル)/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 255ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:45						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:PLD(ドキシル)/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:45						