

レジメン名称 : ペムブロリスマブ (キイトルーダ) (MSI-High用)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|----------------|-------|-------|-----|----|
| 02 | 点滴注射 | キイトルーダ静注 100mg | 200mg | 200mg | 200 | mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:ペムブロリスマブ (キイトルーダ) (MSI-High用) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用 | 1B | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | キイトルーダ静注 100mg 生理食塩液 50mL 療法名:ペムブロリスマブ (キイトルーダ) (MSI-High用) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 0mg 1B | 10:00 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:ペムブロリスマブ (キイトルーダ) (MSI-High用) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用 | 1B | 10:30 | | | | | | |