

レジメン名称 : 大腸 5FU/ 1 -LV/Rad

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	10mg/m2	20mg	10	mg/m2
03	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	350mg/m2	700mg	350	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴注射	グラセプトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:大腸 5FU/ 1 -LV/Rad 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
02	点滴注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/ 1 -LV/Rad 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30		
03	点滴注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/ 1 -LV/Rad 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:35	10:35	10:35	10:35	10:35		
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 5FU/ 1 -LV/Rad 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:40	10:40	10:40	10:40	10:40		
05	静脈注射	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 5mL 療法名:大腸 5FU/ 1 -LV/Rad 静脈内注射:	1本	1回	1回	1回	1回	1回		