

レジメン名称 : 大腸 (BSA2㎡以上) FOLFIRI/ヘクティビックス

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL	6mg/kg	6mg/kg	6	mg/kg
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	200mg/m2	200	mg/m2
05	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	150mg/m2	150mg/m2	150	mg/m2
06	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	400mg/m2	400mg/m2	400	mg/m2
08	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	2400mg/m2	2400mg/m2	2400	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 1.65mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 (BSA2㎡以上) FOLFIRI/ヘクティビックス 中心静脈注射: 点滴速度 219ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	3A 1A 1A 1V 1B	10:00						
02	中心静脈注射	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 (BSA2㎡以上) FOLFIRI/ヘクティビックス 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1B	10:30						
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 (BSA2㎡以上) FOLFIRI/ヘクティビックス 中心静脈注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	11:30						
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 (BSA2㎡以上) FOLFIRI/ヘクティビックス 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	11:45						
05	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 (BSA2㎡以上) FOLFIRI/ヘクティビックス	0mg 1袋	11:45						

レジメン名称 : 大腸 (BSA2m²以上) FOLFIRI/ヘクテイックス

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	中心静脈注射	中心静脈注射: 点滴速度 625ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈側管1 フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 (BSA2m ² 以上) FOLFIRI/ヘクテイックス	0mg 1B	13:45						
07	点滴注射	中心静脈注射: 点滴速度 683ml/min : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 (BSA2m ² 以上) FOLFIRI/ヘクテイックス	1B	13:48						
08	中心静脈注射	点滴注射: 点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ポンプ前フラッシュ フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 (BSA2m ² 以上) FOLFIRI/ヘクテイックス	0mg 1B	13:51						
09	静脈注射	中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ヘパリンNa ⁺ 用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:大腸 (BSA2m ² 以上) FOLFIRI/ヘクテイックス 静脈内注射:	1本	1回						