

レジメン名称 : 大腸<BSA2m²以上>TAS102/Bmab (5mg/kg)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	5mg/kg	5mg/kg	5	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸<BSA2m ² 以上>TAS102/Bmab (5mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 33.3ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00						
02	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:大腸<BSA2m ² 以上>TAS102/Bmab (5mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 66.8ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢側管1 2回目以降30分まで短縮可	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸<BSA2m ² 以上>TAS102/Bmab (5mg/kg) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						