

レジメン名称 : 大腸 CPT-11 (2W)/アビタックス・イメント (初回d1) インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	中心静脈注射	アービタックス注射液 100mg	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
05	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	150mg/m2	300mg	150	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 CPT-11 (2W)/アビタックス・イメント (初回) 中心静脈注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1A 1B	10:00						
02	中心静脈注射	デキサート注射液 1.65mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 CPT-11 (2W)/アビタックス・イメント (初回) 中心静脈注射: 点滴速度 217ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	3A 1A 1V 1B	10:15						
03	中心静脈注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 CPT-11 (2W)/アビタックス・イメント (初回) 中心静脈注射: 点滴速度 4125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:45						
04	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 CPT-11 (2W)/アビタックス・イメント (初回) 中心静脈注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	12:45						
05	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:大腸 CPT-11 (2W)/アビタックス・イメント (初回) 中心静脈注射: 点滴速度 833ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	13:45						
06	点滴注射	生理食塩液 50mL	1B	15:15						

レジメン名称 : 大腸 CPT-11 (2W) /ア-ビ`タックス・イメント` (初回d1) インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
07	静脈注射	療法名:大腸 CPT-11 (2W) /ア-ビ`タックス・イメント` (初 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ハ`リンNa`ック用100単位/mLシリンジ` 10mL 療法名:大腸 CPT-11 (2W) /ア-ビ`タックス・イメント` (初 静脈内注射:	1本	1回						