

レジメン名称 : 大腸 FOLFOXIRI・イメト[®]

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	165mg/m2	330mg	165	mg/m2
03	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg) (毒薬)	85mg/m2	170mg	85	mg/m2
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
06	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	3200mg/m2	6400mg	3200	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イメト [®] 中心静脈注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1.5V 1A 1V 1B	10:00						
02	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イメト [®] 中心静脈注射: 点滴速度 1075ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イメト [®] 点滴注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	11:30						
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イメト [®] 中心静脈注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	11:30						
05	点滴注射	L-OHPと同時に投与 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イメト [®] 点滴注射:	1B	13:30						

レジメン名称 : 大腸 FOLFOXIRI・イマト[®]

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
06	中心静脈注射	点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イマト [®] 中心静脈注射:	0mg 1B	13:35						
07	静脈注射	点滴速度 334ml/h : *点滴時間 48時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 パ [®] リンNa [®] ク用100単位/mLシリンジ [®] 10mL 療法名:大腸 FOLFOXIRI・イマト [®] 静脈内注射:	1本	1回						