

レジメン名称 : 大腸 m-FOLFOX6

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技     | 薬剤名称                          | 標準値       | 上限値    | 設定量  | 単位    |
|----|--------|-------------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 02 | 中心静脈注射 | レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)     | 200mg/m2  | 400mg  | 200  | mg/m2 |
| 03 | 中心静脈注射 | エルプラット点滴静注液 (50mg 100mg) (毒薬) | 85mg/m2   | 170mg  | 85   | mg/m2 |
| 04 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)      | 400mg/m2  | 800mg  | 400  | mg/m2 |
| 06 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)      | 2400mg/m2 | 4800mg | 2400 | mg/m2 |

| RP | 手技     | 薬剤名称   | 用量/単位                | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 中心静脈注射 | デキサート注射液 6.6mg<br>ガスター注射液 20mg/2mL<br>アロキシ静注 0.75mg/5mL<br>生理食塩液 100mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>中心静脈注射:<br>点滴速度 218ml/h : *点滴時間 30分で<br>投与経路:中心静脈ルートメイン1<br>20cmエクステンション | 1V<br>1A<br>1V<br>1B | 10:00 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 中心静脈注射 | レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)<br>生理食塩液 500mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>中心静脈注射:<br>点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で<br>投与経路:中心静脈ルートメイン1   | 0mg<br>1袋            | 10:30 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 中心静脈注射 | エルプラットと同時スタート (側管より)<br>エルプラット点滴静注液 (50mg 100mg) (毒薬)<br>ブドウ糖注 5% 250mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>中心静脈注射:<br>点滴速度 550ml/h : *点滴時間 2時間で<br>投与経路:中心静脈側管1                    | 0mg<br>1袋            | 10:30 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 中心静脈注射 | レボホリナートと同時スタート<br>アレルギーに注意<br>フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>中心静脈注射:<br>点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で<br>投与経路:中心静脈ルートメイン1                      | 0mg<br>1B            | 12:30 |  |  |  |  |  |  |

レジメン名称 : 大腸 m-FOLFOX6

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技     | 薬剤名称   | 用量/単位     | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 05 | 点滴注射   | 生理食塩液 50mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>点滴注射:<br>点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で<br>投与経路:中心静脈ルートメイン1<br>ポンプ 前フラッシュ   | 1B        | 12:33 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 中心静脈注射 | フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)<br>生理食塩液 50mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>中心静脈注射:<br>点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で<br>投与経路:中心静脈ルートメイン1<br>終了日時 ポンプ 内充填<br>刺入部・センサー固定 クレーム開放 | 0mg<br>1B | 12:36 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 静脈注射   | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL<br>療法名:大腸 m-FOLFOX6<br>静脈内注射:<br>自宅持ち帰り<br>PDA登録   | 1本        | 1回    |  |  |  |  |  |  |