

レジメン名称 : 大腸 XELOX/Bmab (7.5mg/kg) (2回目～)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg)	7.5mg/kg	750mg	7.5	mg/kg
04	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg) (毒薬)	130mg/m2	260mg	130	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 XELOX/Bmab(7.5mg/kg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 218ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 ゼロータ処方確認	1V 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	ベバシズマブBS注(100mg 400mg) 生理食塩液 100mL 療法名:大腸 XELOX/Bmab(7.5mg/kg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 XELOX/Bmab(7.5mg/kg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
04	点滴注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:大腸 XELOX/Bmab(7.5mg/kg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 900ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 血管痛に配慮 アレルギーに注意	0mg 1袋	11:15						
05	点滴注射	ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:大腸 XELOX/Bmab(7.5mg/kg) (2回目～ 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で	1V	13:15						

