

レジメン名称 : 大腸 セツキシマブ / エンコラフェニブ / ビニメチニブ (初回) インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	アービタックス注射液 100mg	400mg/m2	420mg/m2	400	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:大腸 セツキシマブ / エンコラフェニブ / ビニメチニブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1A 1A 1B	10:00						
02	点滴注射	アービタックス注射液 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:大腸 セツキシマブ / エンコラフェニブ / ビニメチニブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 4125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:15						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:大腸 セツキシマブ / エンコラフェニブ / ビニメチニブ (初回) 点滴注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:15						