

レジメン名称 : 臍 FOLFIRINOX・アプレピタント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg)(毒薬)	85mg/m2	170mg	85	mg/m2
03	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL	180mg/m2	360mg	180	mg/m2
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	400mg	200	mg/m2
05	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
07	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	2400mg/m2	4800mg	2400	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:臍 FOLFIRINOX・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 220ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 アプレピタント125mg内服 day2,3確認 内服30分後開始20cmエクステンション	1.5V 1A 1V 1V	10:00						
02	中心静脈注射	エルプラット点滴静注液(50mg 100mg)(毒薬) ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:臍 FOLFIRINOX・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 550ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 アレルギーに注意	0mg 1袋	10:30						
03	中心静脈注射	カンプト点滴静注 100mg/5mL 生理食塩液 500mL 療法名:臍 FOLFIRINOX・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 700ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 レボホリナートと同時スタート	0mg 1袋	12:30						
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 500mL 療法名:臍 FOLFIRINOX・アプレピタント 中心静脈注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で	0mg 1袋	12:30						

レジメン名称 : 膝 FOLFIRINOX・アプレピタント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
05	中心静脈注射	投与経路:中心静脈側管1 カプトと同時スタート(側管より) フルオロウラシル注(250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:膝 FOLFIRINOX・アプレピタント 中心静脈注射:	0mg 1B	14:30						
06	点滴注射	点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 急速静注 生理食塩液 50mL 療法名:膝 FOLFIRINOX・アプレピタント 点滴注射:	1B	14:33						
07	中心静脈注射	点滴速度 1000ml/h : *点滴時間 3分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 ポンプ前フラッシュ フルオロウラシル注(250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:膝 FOLFIRINOX・アプレピタント 中心静脈注射:	0mg 1B	14:36						
08	静脈注射	点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 終了日時 ポンプ内充填 刺入部・センサー固定 クレンメ開放 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:膝 FOLFIRINOX・アプレピタント 静脈内注射: 自宅に持ち帰り PDA登録	1本	1回						