

レジメン名称 : 臍 nal-IRI/5FU/LV・アプレタント

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	オニバイド点滴静注 43mg/10mL	70mg/m2	73.5mg/m2	70	mg/m2
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg)	200mg/m2	210mg/m2	200	mg/m2
05	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg)	2400mg/m2	2520mg/m2	2400	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	中心静脈注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 100mL 療法名:臍 nal-IRI/5FU/LV・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 432ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1.5 V 1 V 1 B	10:00						
02	中心静脈注射	オニバイド点滴静注 43mg/10mL 生理食塩液 500mL 療法名:臍 nal-IRI/5FU/LV・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 800ml/h : *点滴時間 90分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:15						
03	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 nal-IRI/5FU/LV・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1 B	11:45						
04	中心静脈注射	レボホリナート点滴静注用 (25mg 100mg) 生理食塩液 250mL 療法名:臍 nal-IRI/5FU/LV・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	12:00						
05	中心静脈注射	フルオロウラシル注 (250mg 1000mg) 生理食塩液 50mL 療法名:臍 nal-IRI/5FU/LV・アプレタント 中心静脈注射: 点滴速度 261ml/h : *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1 B	14:00						
06	静脈注射	ハプリンNaパック用100単位/mLシリンジ 10mL	1本	1回						

