

レジメン名称 : 臍 低用量GEM/Rad

インターバル日数 : 36 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	250mg/m2	262.5mg/m2	250	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:臍 低用量GEM/Rad 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:臍 低用量GEM/Rad 点滴注射: 点滴速度 2700ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 低用量GEM/Rad 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:00						
	<次ページあり>									









レジメン名称 : 臍 低用量GEM/Rad

インターバル日数 : 36 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day36						
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:臍 低用量GEM/Rad 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:臍 低用量GEM/Rad 点滴注射: 点滴速度 2700ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:臍 低用量GEM/Rad 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						