

レジメン名称 : 胆道 GEM/CDDP/S1・アプレ°タト

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|------|---------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 04 | 点滴注射 | ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) | 1000mg/m2 | 2000mg | 1000 | mg/m2 |
| 05 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) | 25mg/m2 | 50mg | 25 | mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|--|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | 硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胆道 GEM/CDDP/S1・アプレ°タト 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 TS-1処方確認 | 8mL 1袋 | 10:00 | | | | | | |
| 02 | 点滴注射 | アプレ°タト125mg内服 day2,3確認 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:胆道 GEM/CDDP/S1・アプレ°タト 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 1袋 | 12:00 | | | | | | |
| 03 | 点滴注射 | デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/S1・アプレ°タト 点滴注射: 点滴速度 232ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1 | 1.5V 1V 1B | 12:00 | | | | | | |
| 04 | 点滴注射 | ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/S1・アプレ°タト 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 30分で投与 血管痛に配慮 | 0mg 1B | 12:15 | | | | | | |
| 05 | 点滴注射 | シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/S1・アプレ°タト 点滴注射: | 0mg 1袋 | 12:45 | | | | | | |

レジメン名称 : 胆道 GEM/CDDP/S1・アプレピタト

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | | | | | | |
|----|------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1 アレルギーに注意 20% マンニトール注射液 300mL 療法名:胆道 GEM/CDDP/S1・アプレピタト 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 | 1B | 13:45 | | | | | | |