

レジメン名称 : 皮膚 (DTIC/ACNU/CDDP)-TAM・イメド[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	ダカルバジン注 100mg	220mg/m2	440mg	220	mg/m2
05	点滴注射	ニドラン注 50mg	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
06	点滴注射	シスプラチン点滴静注 (10mg 50mg)	25mg/m2	50mg	25	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴注射	ソルデム 3A輸液 1L 療法名:皮膚 (DTIC/ACNU/CDDP)-TAM・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	14:00					
02	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソルデム 3A輸液 1L 療法名:皮膚 (DTIC/ACNU/CDDP)-TAM・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 144ml/h : *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	8mL 1袋		09:00	09:00	09:00		
03	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 (DTIC/ACNU/CDDP)-TAM・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1.5V 1A 1V 1B		09:00				
04	点滴注射	ダカルバジン注 100mg 蒸留水 (注射用) 100mL ソリター-T 1号輸液 200mL 「YD」 療法名:皮膚 (DTIC/ACNU/CDDP)-TAM・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢側管1	0mg 40mL 1袋		09:30	09:30	09:30		
05	点滴注射	ニドラン注 50mg 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 (DTIC/ACNU/CDDP)-TAM・イメド [®] 点滴注射:	0mg 20mL 1B		10:30				

