

レジメン名称 : 皮膚 (乾癬) レミケード[®] (6mg/kg) (4回目～)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	レミケード点滴静注用 100mg	6mg/kg	600mg	6	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ヒトロコルチゾン注射用 100mg 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 (乾癬) レミケード [®] (6mg/kg) (4回目) 点滴注射: 点滴速度 208ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1B	10:00						
02	点滴注射	レミケード点滴静注用 100mg 生理食塩液 250mL 療法名:皮膚 (乾癬) レミケード [®] (6mg/kg) (4回目) 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:15						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 (乾癬) レミケード [®] (6mg/kg) (4回目) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:15						