

レジメン名称 : 皮膚 EPI/CBDCA

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カボプ ラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	400mg/m2	800mg	400	mg/m2
06	点滴注射	ファルモルピシン注(10mg 50mg)	60mg/m2	120mg	60	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 EPI/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1A 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	カボプ ラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) 生理食塩液 500mL 療法名:皮膚 EPI/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 1250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:15						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 EPI/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:15						
04	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚 EPI/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 216ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢側管1	1V 1A 1B		10:00	10:00				
05	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:皮膚 EPI/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋		10:00	10:00				
06	点滴注射	ファルモルピシン注(10mg 50mg)	0mg		10:15					

レジメン名称 : 皮膚 EPI/CBDCA

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3				
		生理食塩液 100mL 療法名:皮膚 EPI/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートイン1	1B							