

レジメン名称：皮膚（天疱瘡）リツキサン

インターバル日数：14 日

基準日： Day 1

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg)	1000mg	1000mg	1000	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:皮膚（天疱瘡）リツキサン 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	リツキサン注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:皮膚（天疱瘡）リツキサン 点滴注射: *点滴速度 30ml/h : 点滴時間 16.6時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 30分毎に30mL/hずつ速度UP可 30mL/hから開始 最大240mL/h	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:皮膚（天疱瘡）リツキサン 点滴注射: *点滴速度 0ml/h : 点滴時間 0分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						