

レジメン名称 : 腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (2回目～)

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	トーリセル点滴静注液 25mg	25mg	25mg	25	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	トーリセル点滴静注液 25mg 生理食塩液 250mL 療法名:腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 500ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:腎臓 テムシロリムス(トーリセル) (2回目～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						