

レジメン名称 : 尿路 GEM/CBDCA

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬)	5 (AUC)	6 (AUC)	5	AUC
03	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液 (200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋	10:00						
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 336ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	10:30						
03	点滴注射	アレルギーに注意 ゲムシタビン点滴静注液 (200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 30分で投与 血管痛に配慮	0mg 1B	12:00						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	12:30						
05	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
	<次ページあり>									

レジメン名称 : 尿路 GEM/CBDCA

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1袋							
02	点滴注射	カルボプラチン注 (50mg 150mg) (毒薬) ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 336ml/h : *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
03	点滴注射	アレルギーに注意 ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 30分で投与	0mg 1B	10:30						
04	点滴注射	血管痛に配慮 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
05	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CBDCA 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						