

レジメン名称 : 尿路 GEM/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg)	1000mg/m2	2000mg	1000	mg/m2
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg)	70mg/m2	140mg	70	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋		09:00 15:30 20:00					
05	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋		11:00					
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	1.5V 1V 1B		13:00					



レジメン名称 : 尿路 GEM/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	ゲラネトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
05	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋							
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B							
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	0mg 1袋							



レジメン名称 : 尿路 GEM/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	ゲラニトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	10:00						
02	点滴注射	ゲムシタビン点滴静注液(200mg 1000mg) 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:30						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	11:00						
04	点滴注射	生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
05	点滴注射	硫酸Mg補正液 20mEq/20mL ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 254ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	8mL 1袋							
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1.5V 1V 1B							
07	点滴注射	シスプラチン点滴静注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	0mg 1袋							

レジメン名称 : 尿路 GEM/CDDP・イメト<sup>®</sup>

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
08	点滴注射	点滴速度 950ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	1A 1B							
09	点滴注射	点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射:	1袋							
10	点滴注射	点滴速度 250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 GEM/CDDP・イメト <sup>®</sup> 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1V 1B							