

レジメン名称 : 尿路 MEC・イムト[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	30mg/m2	60mg	30	mg/m2
03	点滴注射	エピルビシン注射用50mg	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
07	点滴注射	ブリプラチン注(10mg 50mg)	100mg/m2	200mg	100	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキシ静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B	10:00						
02	点滴注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1V	10:30						
03	点滴注射	エピルビシン注射用50mg 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	11:30						
04	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本	12:00 17:00						
05	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本		09:00 15:00 21:00					
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL	1V 1B		10:00	10:00	10:00			

レジメン名称 : 尿路 MEC・イムト[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
07	点滴注射	療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ブリプラチン注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL	0mg 1袋		10:30					
08	点滴注射	療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 1250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL	1A 1B		12:30					
09	点滴注射	療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL	1本			03:00				
10	点滴注射	療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン G注 500mL	1B			09:00 14:00 19:00	09:00 14:00 19:00	09:00 14:00 19:00		
11	点滴注射	療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ナゼア注射液 0.3mg/2mL 生理食塩液 50mL	1A 1B							
12	点滴注射	療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
	<次ページあり>									

レジメン名称 : 尿路 MEC・イメド[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	ミトレキート(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1V							
03	点滴注射	エピルビシン注射用50mg 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B							
04	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本							
05	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本							
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1V 1B							
07	点滴注射	ブリプラチン注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®]	0mg 1袋							

レジメン名称 : 尿路 MEC・イメド[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg アロキン静注 0.75mg/5mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 116ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1.5V 1V 1B							
02	点滴注射	ミノレキセト(5mg50mg200mg1000mg) ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1V	10:30						
03	点滴注射	エピルピシン注射用50mg 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B							
04	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本							
05	点滴注射	ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本							
06	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®] 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1V 1B							
07	点滴注射	ブリプラチン注(10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:尿路 MEC・イメド [®]	0mg 1袋							

レジメン名称 : 尿路 MEC・イムト[®]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15						
08	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 1250ml/h : *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢側管1 フロセミド注射液 20mg/2mL 生理食塩液 100mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®]	1A 1B							
09	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 204ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 ソリューゲン F注 500mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®]	1本							
10	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ソリューゲン G注 500mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®]	1B							
11	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 ナゼア注射液 0.3mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®]	1A 1B	10:00						
12	点滴注射	点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1 生理食塩液 50mL 療法名:尿路 MEC・イムト [®] 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	11:30						