

レジメン名称 : 午前・肝動注 (50mg) EPI

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
10	動脈注射	エピルビシン注射用50mg	50mg	50mg	50	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
01	点滴注射	ガスター注射液 20mg/2mL ラクテック輸液 500mL 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1袋	06:00						
02	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1	1袋	08:00						
03	点滴注射	ラクテック輸液 500mL 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	11:00						
04	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	16:00						
05	点滴注射	セフメタゾールバッグ 1g(生食100mL付) 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本	夕	朝 夕					
06	点滴注射	セフメタゾールバッグ 1g(生食100mL付) 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1本	帰宅時						
07	静脈注射	リドカイン静注2%(100mg/5mL)シリンジ 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI	1本	1回						

レジメン名称 : 午前・肝動注 (50mg) EPI

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2					
08	静脈注射	静脈内注射: アタラックスP注射液 25mg/1mL 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 静脈内注射: IVR室持参	1A	1回						
09	静脈注射	ハパリンNa注射液用100単位/mLシリンジ 10mL 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 静脈内注射: エピルビシン注射用50mg	1本	1回	2回					
10	動脈注射	蒸留水 (注射用) 20mL 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 動脈注射: 肝動脈	0mg 5mL	1回						
11	点滴注射	ソリター-T 3号 輸液 500mL 「YD」 療法名:午前・肝動注 (50mg) EPI 点滴注射: 点滴速度 50ml/h : *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋		朝					