

レジメン名称 : Ph+ALL208IMA consolidation #2

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg	60mg/m2	120mg	60	mg/m2
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg)	1200mg/m2	2400mg	1200	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Ph+ALL208IMA consolidation #2 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:15						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:Ph+ALL208IMA consolidation #2 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	09:45						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:Ph+ALL208IMA consolidation #2 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:Ph+ALL208IMA consolidation #2 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋	11:00						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:Ph+ALL208IMA consolidation #2 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 抗がん剤投与終了後フラッシュ用	1B	1回						