

レジメン名称 : AML (寛解・A群) IDR (5-7) / Ara-C (1-7)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	シタレン注(400mg1000mg)	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
03	点滴注射	イダマイシン静注用 5mg (毒薬)	12mg/m2	24mg	12	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:AML (寛解・A群) IDR (5-7) / Ara-C (1-7) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	09:00	09:00	09:00
02	点滴注射	シタレン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:AML (寛解・A群) IDR (5-7) / Ara-C (1-7) 点滴注射: 点滴速度 104ml/h : *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
03	点滴注射	イダマイシン静注用 5mg (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 100mL 療法名:AML (寛解・A群) IDR (5-7) / Ara-C (1-7) 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢側管1 day1 : メインより投与	0mg 20mL 1B					09:30	09:30	09:30
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:AML (寛解・A群) IDR (5-7) / Ara-C (1-7) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							1回