

レジメン名称 : B-ALL213 consolidation #1, 4

インターバル日数 : 4 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	シタレピン注(400mg1000mg)	2000mg/m2	4000mg	2000	mg/m2
04	点滴注射	ベプシト [®] 100mg/5mL【専用セット】	100mg/m2	200mg	100	mg/m2
07	脳脊髄注射	メトトレキサート(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg
07	脳脊髄注射	キロサイド注 40mg	40mg	40mg	40	mg
08	点滴注射	ロイナーゼ注5, 000K	10000単位/m2	20000単位	10000	単位/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 100mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 110ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	5V 1B	09:00	09:00	09:00				
02	点滴注射	グラネトロン点滴静注バッグ [®] 3mg/50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	10:00	10:00	10:00				
03	点滴注射	シタレピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 全量500mLに調製	0mg 1袋	10:30 22:30	10:30 22:30	10:30 22:30				
04	点滴注射	【170mL/h、3時間で投与】 ベプシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 750ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	13:30	13:30	13:30				
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1B	1回	1回	1回	1回			

レジメン名称 : B-ALL213 consolidation #1, 4

インターバル日数 : 4 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4			
06	点滴注射	投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用 ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1B	2回	2回	2回				
07	脳脊髄注射	投与経路:末梢ルートメイン1 ベプシド前後フラッシュ用 ミトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A	1回						
08	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:B-ALL213 consolidation #1, 4 点滴注射: 点滴速度 125ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0単位 1袋				1回			