

レジメン名称 : Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース目)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	点滴注射	エトキシ注 (100mg 500mg)	300mg/m2	600mg	300	mg/m2
05	脳脊髄注射	メトトレキサート(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg
05	脳脊髄注射	キロサイド注 40mg	40mg	40mg	40	mg
06	点滴注射	オンコビン 1mg	1.4mg/m2	2mg	1.4	mg/m2
07	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg)	50mg/m2	100mg	50	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	5V 1B	09:00	09:00	09:00	09:00			
02	点滴注射	グレースロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30			
03	点滴注射	エトキシ注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	10:00 22:00	10:00 22:00	10:00 22:00				
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	2回	2回	2回		1回		
05	脳脊髄注射	メトトレキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A	1回						

レジメン名称 : Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース目)

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	5V 1B				09:00	09:00	09:00	09:00
02	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋							
03	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 83.3ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B				1回			
05	脳脊髄注射	メトキシート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL	0mg 0mg 2A							
06	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 50mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース) 点滴注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B				09:30			
07	点滴注射	ドキシソルビシン注射液 (10mg 50mg) 生理食塩液 500mL 療法名:Burkitt-ALL213 Regimen A(2.3.4コース)	0mg 1袋							

