

レジメン名称 : ② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称              | 標準値      | 上限値   | 設定量 | 単位    |
|----|------|-------------------|----------|-------|-----|-------|
| 01 | 静脈注射 | ベルケイト注射用 3mg (毒薬) | 1.3mg/m2 | 2.6mg | 1.3 | mg/m2 |

| RP | 手技       | 薬剤名称   | 用量/単位          | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|----------|--|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | 静脈注射     | ベルケイト注射用 3mg (毒薬)<br>生理食塩液 20mL<br>療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)<br>静脈内注射:<br>生食3mL/Vで溶解 (1mg/mL)   | 0mg<br>1A      | 1回   |      |      | 1回   |      |      |      |
| 02 | 静脈注射     | 生食注射液 10mL<br>療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)<br>静脈内注射:   | 1本             | 1回   |      |      | 1回   |      |      |      |
| 03 | 点滴注射     | デキサート注射液 1.65mg<br>デキサート注射液 6.6mg<br>生理食塩液 500mL<br>療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)<br>点滴注射:<br>点滴速度 251ml/h : *点滴時間 2時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1 | 1A<br>1V<br>1袋 | 1回   |      |      | 1回   |      |      |      |
|    | <次ページあり> |  |                |      |      |      |      |      |      |      |

レジメン名称 : ② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技   | 薬剤名称   | 用量/単位          | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 |  |  |  |
|----|------|--|----------------|------|------|-------|-------|--|--|--|
| 01 | 静脈注射 | ベルケイト注射用 3mg (毒薬)<br>生理食塩液 20mL<br>療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)<br>静脈内注射:<br>生食3mL/Vで溶解 (1mg/mL)   | 0mg<br>1A      | 1回   |      |       | 1回    |  |  |  |
| 02 | 静脈注射 | 生食注射液 10mL<br>療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)<br>静脈内注射:   | 1本             | 1回   |      |       | 1回    |  |  |  |
| 03 | 点滴注射 | デキサート注射液 1.65mg<br>デキサート注射液 6.6mg<br>生理食塩液 500mL<br>療法名:② ホルテゾミブ (ベルケイト) (1-8サイクル)<br>点滴注射:<br>点滴速度 251ml/h : *点滴時間 2時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1 | 1A<br>1V<br>1袋 | 1回   |      |       | 1回    |  |  |  |