

レジメン名称 : DBd(4-8サイクル) 【SC用】

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800mg	1800mg	1800	mg
02	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	1.3mg/m2	2.6mg	1.3	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DBd(4-8サイクル) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	10:05						
02	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(4-8サイクル) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			
	<次ページあり>									

レジメン名称 : DBd(4-8サイクル) 【SC用】

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11			
01	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DBd(4-8サイクル) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg							
02	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(4-8サイクル) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			