

レジメン名称 : DKd(1サイクル目) 【SC用】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬)	20mg/m2	21mg/m2	20	mg/m2
04	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800mg	1800mg	1800	mg
06	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬)	56mg/m2	58.8mg/m2	56	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキープ用	1B	10:00	10:00					
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 20mL 1V	10:00	10:00					
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B	10:30						
04	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	11:00						
05	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B		10:30					
06	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】	0mg 50mL 1V							

レジメン名称 : DKd(1サイクル目) 【SC用】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22						
01	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 ルートキャブ 用	1B							
02	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 240ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 20mL 1V							
03	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
04	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	0mg	11:00						
05	点滴注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1B							
06	点滴注射	カイプロリス点滴用 (10mg 40mg) (毒薬) 蒸留水 (注射用) 100mL ブドウ糖注 5% 100mL 療法名:DKd(1サイクル目) 【SC用】 点滴注射: 点滴速度 300ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 50mL 1V							