

レジメン名称 : EPd(3サイクル～)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
04	点滴注射	エムプリシティ点滴用 (300mg400mg)	20mg/kg	21mg/kg	20	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	デキサート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:EPd(3サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 208ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1V 1B	09:30						
02	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL ガスター注射液 20mg/2mL 生理食塩液 50mL 療法名:EPd(3サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 212ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1A 1B	09:45						
03	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:EPd(3サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	10:00						
04	点滴注射	エムプリシティ点滴用 (300mg400mg) 蒸留水 (注射用) 100mL 生理食塩液 250mL 療法名:EPd(3サイクル～) 点滴注射: *点滴速度 120ml/h : 点滴時間 2.08時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 20mL 230mL	10:30						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:EPd(3サイクル～) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						