

レジメン名称 : R【BS】-THP-COP(R : 700mg) (初回)

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	200mg	200mg	200	mg
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg
05	点滴注射	ピノルビン注 10mg	50mg/m2	100mg	50	mg/m2
06	点滴注射	オンコビン 1mg	1.4mg/m2	2mg	1.4	mg/m2
07	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	750mg/m2	1500mg	750	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:R【BS】-THP-COP(R : 700mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 250mL 療法名:R【BS】-THP-COP(R : 700mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 22.5ml/h : *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 180mL	10:30						
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:R【BS】-THP-COP(R : 700mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 180ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 450mL	12:30						
04	点滴注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:R【BS】-THP-COP(R : 700mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	13:00						
05	点滴注射	ピノルビン注 10mg ブドウ糖注 5% 100mL	0mg 1V	13:30						

