

レジメン名称 : リツキシマブ BS (600mg) (初回)

インターバル日数 : 1 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	100mg	100mg	100	mg
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg)	500mg	500mg	500	mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1						
01	点滴注射	ポララミン注 5mg/1mL 生理食塩液 50mL 療法名:リツキシマブ BS (600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1A 1B	10:00						
02	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 100mL 療法名:リツキシマブ BS (600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 22.5ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 90mL	10:30						
03	点滴注射	リツキシマブBS点滴静注(100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:リツキシマブ BS (600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 90ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 初回 1時間毎に投与速度UP可能 25mL/h→100mL/h→200mL/h	0mg 450mL	12:30						
04	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:リツキシマブ BS (600mg) (初回) 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回						