

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#1・4

インターバル日数 : 3 日

基準日 : Day 1

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|-------|------------------------------------|-----------|--------|------|-------|
| 03 | 点滴注射 | シタレピン注(400mg1000mg) | 2000mg/m2 | 4000mg | 2000 | mg/m2 |
| 04 | 点滴注射 | ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 | 100mg/m2 | 200mg | 100 | mg/m2 |
| 07 | 脳脊髄注射 | メトトレキサート(5mg50mg200mg1000mg) | 15mg | 15mg | 15 | mg |
| 07 | 脳脊髄注射 | キロサイド注 40mg | 40mg | 40mg | 40 | mg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 01 | 点滴注射 | デキササート注射液 6.6mg 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 点滴注射: 点滴速度 120ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 5V 1B | 09:00 | 09:00 | 09:00 | | | | |
| 02 | 点滴注射 | グラネセロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1袋 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | | | | |
| 03 | 点滴注射 | シタレピン注(400mg1000mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 点滴注射: 点滴速度 0ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 全量500mLに調製 | 0mg 1袋 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | 10:00 22:00 | | | | |
| 04 | 点滴注射 | 【170mL/h、3時間で投与】 ベブシト [®] 100mg/5mL【専用セット】 ブドウ糖注 5% 250mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 点滴注射: 点滴速度 750ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 0mg 1袋 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | | | | |
| 05 | 点滴注射 | ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 | 1B | 2回 | 2回 | 2回 | | | | |

レジメン名称 : T-ALL213-0 consolidation#1・4

インターバル日数 : 3 日

基準日 : Day 1

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day1 | Day2 | Day3 | | | | |
|----|-------|---|------------------|------|------|------|--|--|--|--|
| 06 | 点滴注射 | ベプト前後フラッシュ 生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン1 フラッシュ用 | 1B | 1回 | 1回 | 1回 | | | | |
| 07 | 脳脊髄注射 | ムトレキセト(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 consolidation#1・4 脳脊髄注射: 腰椎 全量3mL | 0mg 0mg 2A | 1回 | | | | | | |