

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction

インターバル日数 : 29 日

基準日 : Day 8

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	点滴注射	オンコビン 1 mg	1.3mg/m2	2mg	1.3	mg/m2
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg	45mg/m2	90mg	45	mg/m2
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	1200mg/m2	2400mg	1200	mg/m2
06	脳脊髄注射	リトレキセト(5mg50mg200mg1000mg)	15mg	15mg	15	mg
06	脳脊髄注射	キロサイド注 40mg	40mg	40mg	40	mg
07	点滴注射	ロイナーゼ注5, 0 0 0 K	5000単位/m2	10000単位	5000	単位/m2
09	点滴注射	ロイナーゼ注5, 0 0 0 K	5000単位/m2	10000単位	5000	単位/m2
10	点滴注射	ロイナーゼ注5, 0 0 0 K	5000単位/m2	10000単位	5000	単位/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30				
02	点滴注射	オンコビン 1 mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1B	10:15	10:00	10:00				
04	点滴注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 1袋	11:15						
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射:	1B	1回	1回	1回				

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction

インターバル日数 : 29 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	点滴注射	グレーストン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	2回		1回		1回		1回
06	脳脊髄注射	リトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 induction 脳脊髄注射: 腰椎 全量 3 mL	0mg 0mg 2A	1回						
07	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL	0単位 1袋	1回						

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction

インターバル日数 : 29 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	点滴注射	グレーストン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1 フラッシュ用	1B	1回	1回		1回		1回	
06	脳脊髄注射	リトキサート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 induction 脳脊髄注射: 腰椎 全量 3 mL	0mg 0mg 2A							
07	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL	0単位 1袋							

レジメン名称 : T-ALL213-0 induction

インターバル日数 : 29 日

基準日 : Day 8

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day29						
01	点滴注射	グレーストン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1袋	09:30						
02	点滴注射	オンコビン 1mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 400ml/h : *点滴時間 15分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B	10:00						
03	点滴注射	ダウノマイシン注 20mg 生理食塩液 100mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1B							
04	点滴注射	エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン 1	0mg 1袋							
05	点滴注射	生理食塩液 50mL 療法名:T-ALL213-0 induction 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:末梢ルートメイン 1	1B	2回						
06	脳脊髄注射	フラッシュ用 メトキシート(5mg50mg200mg1000mg) キロサイド注 40mg デキサート注射液 1.65mg 療法名:T-ALL213-0 induction 脳脊髄注射: 腰椎 全量 3 mL	0mg 0mg 2A							
07	点滴注射	ロイナーゼ注 5, 000K ブドウ糖注 5% 500mL	0単位 1袋							

