

レジメン名称 : 移植 BU/Me1 【改1】

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	3.2mg/kg	3.36mg/kg	3.2	mg/kg
04	静脈注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬)	140mg/m2	147mg/m2	140	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2		
01	中心静脈注射	グラセプトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 BU/Me1 【改1】 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:00	09:00	09:00	09:00	09:00		
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 BU/Me1 【改1】 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	09:30	09:30	09:30	09:30			
03	点滴注射	10倍量の生理食塩液に添加 生理食塩液 50mL 療法名:移植 BU/Me1 【改1】 点滴注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回		
04	静脈注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬) 療法名:移植 BU/Me1 【改1】 静脈内注射:	0mg					09:30		
05	静脈注射	生食注シリンジ 10mL 療法名:移植 BU/Me1 【改1】 静脈内注射: アルケラン後フラッシュ	1本					1回		