

レジメン名称 : 移植 Cy / r ATG (/TBI)

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg)	50mg/kg	5000mg	50	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2	
01	中心静脈注射	ゼットブリン点滴静注用 100mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 Cy / r ATG (/TBI) 中心静脈注射: 点滴速度 128ml/h : *点滴時間 4時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	3V 1袋	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00		
02	中心静脈注射	グラネセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 Cy / r ATG (/TBI) 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋			10:30	10:30	10:30	10:30	
03	中心静脈注射	エンドキサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 Cy / r ATG (/TBI) 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋			11:00	11:00	11:00	11:00	
04	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 Cy / r ATG (/TBI) 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	1A 1B			11:00 15:00 19:00	11:00 15:00 19:00	11:00 15:00 19:00	11:00 15:00 19:00	