

レジメン名称：移植 ETP/Cy/TBI (12Gy)

インターバル日数：28 日

基準日： Day -6

使用する抗がん剤：

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値 | 上限値 | 設定量 | 単位 |
|----|--------|-------------------------|----------|--------|-----|-------|
| 02 | 中心静脈注射 | ベプトシド 100mg/5mL 【専用セット】 | 2.5mg/kg | 250mg | 2.5 | mg/kg |
| 04 | 中心静脈注射 | エトキシカン注 (100mg 500mg) | 60mg/kg | 6000mg | 60 | mg/kg |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | Day-9 | Day-8 | Day-7 | Day-6 | | | |
|----|--------|---|-----------|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| 01 | 中心静脈注射 | グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 1袋 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | | | |
| 02 | 中心静脈注射 | ベプトシド 100mg/5mL 【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 0mg 1袋 | 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 | 10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30 | | | | | |
| 03 | 中心静脈注射 | ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 1B | 2回 | 2回 | | | | | |
| 04 | 中心静脈注射 | エトキシカン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1 | 0mg 1袋 | | | 10:30 | 10:30 | | | |
| 05 | 中心静脈注射 | ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1 | 1A 1B | | | 10:30 14:30 18:30 | 10:30 14:30 18:30 | | | |
| 06 | 中心静脈注射 | 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で | 1B | | | 14:00 | 14:00 | | | |

