

レジメン名称 : 移植 ivBu/Cy

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -2

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg	3.2mg/kg	320mg	3.2	mg/kg
06	中心静脈注射	エトキシラン注 (100mg 500mg)	60mg/kg	6000mg	60	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-7	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2	
01	中心静脈注射	グラセトン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 ivBu/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	09:30	09:30	10:30	10:30	
02	中心静脈注射	ブスルフェクス点滴静注用 60mg 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:00	10:00	10:00	10:00			
03	中心静脈注射	10倍量の生理食塩液に添加 ソリター-T 2号輸液 500mL 療法名:移植 ivBu/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1本	3回	3回	3回	3回			
04	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:移植 ivBu/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1B	1回	1回	1回	1回	1回	1回	
05	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ivBu/Cy 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	1A 1B					11:00 15:00 19:00	11:00 15:00 19:00	
06	中心静脈注射	エトキシラン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ivBu/Cy 中心静脈注射:	0mg 1袋					11:00	11:00	

