

レジメン名称 : 移植 M-BEAM

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day -1

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
03	中心静脈注射	サイメリン注 50mg	300mg/m2	750mg	300	mg/m2
05	中心静脈注射	シラベリン注(400mg1000mg)	200mg/m2	500mg	200	mg/m2
06	中心静脈注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	200mg/m2	500mg	200	mg/m2
08	静脈注射	アルケラン静注用 50mg (毒薬)	140mg/m2	350mg	140	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-6	Day-5	Day-4	Day-3	Day-2	Day-1	Day0
01	中心静脈注射	ソリター-T 1号輸液 500mL 「YD」 療法名:移植 M-BEAM 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 5時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	06:00 11:00 16:00						
02	中心静脈注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 M-BEAM 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋		09:30	09:30	09:30	09:30	09:30	09:30
03	中心静脈注射	day 1 : 側管より投与 サイメリン注 50mg 生理食塩液 100mL 療法名:移植 M-BEAM 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 1時間で 投与経路:中心静脈側管1	0mg 1B	10:00						
04	中心静脈注射	ソル・メドロール静注用 40mg 生理食塩液 50mL 療法名:移植 M-BEAM 中心静脈注射: 点滴速度 102ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1V 1B			09:00	09:00	09:00	09:00	
05	中心静脈注射	シラベリン注(400mg1000mg) 生理食塩液 250mL 療法名:移植 M-BEAM 中心静脈注射: 点滴速度 1416ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋			10:00 22:00	10:00 22:00	10:00 22:00	10:00 22:00	
06	中心静脈注射	ベプシド [®] 100mg/5mL【専用セット】	0mg			13:00	13:00	13:00	13:00	

